



## Trachten im Jahreslauf

### **Entwicklungstracht: April bis Mitte Mai**

Haselnuss, Seidelbast, Erle, Weiden (Sal-, Bruch-, Reif-, Purpur-, Grau-, Kübler, Weißweide und andere), Kornelkirsche, Schneeheide, Winterling, Lungenkraut, Buschwindröschen, Küchenschelle, Leberblümchen, Pestwurz, Schneeglöckchen, Lerchensporn, Frühlingsknotenblume, Bärlauch, Traubenhyaazinthe, Krokus, Scilla, Schlehe

### **Frühtracht: Mitte Mai bis Juni**

Obstbäume, Beerensträucher, Ahornarten, Traubenkirsche, Eberesche, Rosskastanie, Mahonie, Blutjohannisbeere, Goldjohannisbeere, Vergissmeinnicht, Löwenzahn, Raps, Rübsen, Senf, Hecken: Weißdorn, Rosen, Zwetschge, Wildapfel, Wildbirne, Felsenbirne, Schneeball, Hartriegel, Mehlbeere, Berberitze

### **Frühsommer: Juni**

Kleearten, Salbei, Natterkopf, Beinwell, Himbeere, Brombeere, Schwarzbeere, Preiselbeere, Robinie, Faulbaum, Ackerbohne, Disteln, Hederich, Kiefer, Mais

### **Sommer: Juli**

Sommerlinde, Winterlinde, Kleearten, Flockenblume, Gamander, Wiesenbärenklau, Luzerne, Esparsette, Phacelia, Buchweizen, Sonneb.lumen, Mais, Samenanbau, Kornblume, Mohn, Fette Henne, Taubnessel, Wilder Wein, Liguster, Gärten: Gewürzkräuter (Boretsch, Zitronenmelisse), Astern, Dahlien

### **Spätsommer: August bis Oktober**

Besenheide, Goldrute, Minzen, Weidenröschen, Efeu, Gärten: Astern, Dahlien

### **Dauertrachten:**

Parks, Friedhöfe

### **Spezialtrachten**

Moor,  
Gebirge: Alpenrose

### **Trachten, vor deren weiterer Ausbreitung abgeraten werden muss:**

Indisches Springkraut an feuchten' Standorten, ebenso Riesenbärenklau, dessen Trachtwert sicher überschätzt wird!

#### **Anschrift**

Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau – Fachzentrum Bienen • An der Steige 15 • 97209 Veitshöchheim  
Telefon (0931) 9801 - 0 • e-mail: [poststelle@lwg.bayern.de](mailto:poststelle@lwg.bayern.de)  
Internet: <http://www.lwg.bayern.de>